

Thở ở Lưỡi

Hỏi: Bệnh thở ở lưỡi là gì? Đáp: Bệnh thở ở lưỡi tiếng Anh gọi là keloids. Thở ở lưỡi (keloids) khác với sẹo phì đại (hypertrophic scar). Sẹo phì đại nhô cao hơn mặt da nhưng nằm trong vệt trí vết sẹo, còn thở ở lưỡi keloids có thể bành trướng ra khỏi giới hạn vết sẹo. Thở ở lưỡi sẹo phì đại sau khi mổ vết sẹo, sau khi bỏ mụn trứng cá trứng cóc, hay cắt da tai (ear lobe) sau khi xạ tai.

Y khoa chưa biết rõ nguyên nhân thở ở lưỡi. Chưa biết thở ở lưỡi có thể do tế bào mô tăng trưởng phát triển quá mức. Đàn bà thấy có nhiều thở ở lưỡi vì xạ tai sẹo phì đại xuyên. Trong vài trường hợp có tính chất di truyền dòng họ. Nhiều người ta thấy nhiều thở ở lưỡi ở ngực, sau lưng, vai, hay da tai. Nên hỏi bác sĩ chuyên khoa cách điều trị. Có nhiều phương pháp kê đơn chích steroids vào thở ở lưỡi, giới phẫu, dùng laser đốt, dán miếng silicone gel, đông lạnh, chích interferon, chích fluorouracil, phóng xạ (radiation), v...v.. Nên nhớ trong nhiều trường hợp giới phẫu xong, thở ở lưỡi còn mọc lên nhiều hơn trước. Cách điều trị thở ở lưỡi ra ngoài phạm vi của Hỏi Đáp Y Học. Vui lòng tham khảo bác sĩ chuyên môn về những hướng quyết định khi quyết định điều trị thở ở lưỡi.

Ho Gà

Hỏi: Ho gà xảy ra khi còn ở Việt Nam, tôi thấy nhiều người bị ho gà. Tôi không nghe thấy ho gà ở Mỹ, vậy có đúng không? Ho gà là gì? Đáp: Ho gà vẫn còn thấy ở Mỹ. Chuyên khoa mắt người lính chưa lâu hành nghề lâu năm ở miền tây tiểu bang Washington, đốt nhiên bị ho nhiều quá. Khi thấy nhiều mũi thấy bị vi trùng Bordetella Pertussis, tức là có vi trùng ho gà. Ở các môi trường học đường trẻ em, người ta vẫn mắc ho gà.

Khi bệnh nhân ho rũ rượi tiếng gọi là ho gà. Ngày xưa chưa có thuốc chủng ngừa thì mỗi năm có 30,000 tới 100,000 người chết vì ho gà ở Mỹ. 40% trẻ dưới 1 tuổi bị ho gà, phần lớn bị nặng. Lớn tuổi hơn, ít nguy cơ bị ho gà hơn. 15% trẻ trên 15 tuổi bị ho gà. Triệu chứng ho gà ban đầu cũng giống như bệnh cúm có: chảy mũi, hắt xì hơi, ho nhẹ và chàm hắt nóng. 1-2 tuần sau thì bệnh ho lên tiếng gọi là ho gà, mỗi lần ho kéo dài tới một phút. Một đợt gay hay tím lưỡi. Ho gà hay lây. Khi ho, người mắc mũi, người mắc mũi có vi trùng Bordetella Pertussis bắn vùng vãi vào người khác, gây bệnh. Người mắc mũi người mắc mũi cũng có thể lây vào tay người khác, hoặc khi quạt tay vào mũi hay vào miệng cũng bị lây bệnh. Hiện giờ có 4 loại chủng ngừa tiếng gọi là DTaP, Tdap, DT và Td. Thuốc chủng

Bệnh Thở o Lởi - Ho Gà

Tác Giả: Bác sĩ Trần Minh Ngô

Chúa Nhật, 19 Tháng 7 Năm 2009 22:16

ngáa DTaP và DT cho trẻ em dái 7 tuái. Tdap và Td cho trẻ em lớn tuái hơn và ngái lớn.
Thuác chủng có chá P là có thuác chủng ngáa ho gà. Cơ Quan Y tế Công Cộng Mỹ vẫn còn lưu
ý ho gà ở các trường tiểu học. Trong một tiến trình y tế tháng Ba 2009, cho biết có khoảng 300 trẻ
300 trẻ 1,000 trường học ho gà ở tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Úc Châu (2008-09) cũng vẫn
có nền dịch ho gà trầm trọng.