

## Thuốc Men: Nhìn Đi u Mà H Không Nói Ra

T&#225;c Gi&#7843;: D&#225;c sĩ Nguyễn Ngọc Lan & Bác sĩ Thú y Nguyễn Thành Chánh  
Th&#7913; S&#225;u, 25 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2009 08:39

---

T&#225;p chí L'Express.Fr s&#225; 14/6/2009 có đăng m&#228;t bài phóng s&#225; vô cùng quan tr&#225;ng v&#225; tình hình thuốc men t&#225;i Pháp

nhân đ&#225; "Médicaments-Tout ce que l'on ne vous dit pas".

Bài phóng s&#225; đ&#225;c căn c&#225; theo tác ph&#225;m "Ces médicaments qui nous rendent malades" c&#225;a Bác sĩ Sauveur Boukris

[http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/tout-ce-que-l-on-ne-vous-dit-pas-sur-les-medicaments\\_764792.html](http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/sante/tout-ce-que-l-on-ne-vous-dit-pas-sur-les-medicaments_764792.html)



### Tình hình đáng ng&#225;i

Bác sĩ Sauveur đã mô t&#225; cho dân chúng bi&#228;t m&#228;t tình hình không m&#225;y sáng s&#225;a c&#225;a ngành d&#225;c ph&#225;m Pháp nói ri&#225;ng, và c&#225;a c&#225; th&#225; gi&#225;i nói chung.

M&#228;t s&#225; bác sĩ không n&#225;m v&#225;ng t&#225;ng t&#225;n các ph&#225;n n&#225;ng ph&#225; c&#225;a món thuốc.

Các đ&#225;i công ty d&#225;c ph&#225;m t&#225;ng t&#225;ng và sáng ch&#225; ra thêm nh&#225;ng b&#225;nh không t&#225;ng.

Các gi&#225;i trách nhi&#225;m thì th&#225; trong v&#225;n đ&#225; s&#225;c kh&#225;e c&#225;a dân chúng.

Các lobby vô cùng th&#225; l&#225;c c&#225;a các đ&#225;i tài phi&#225;t d&#225;c ph&#225;m đã không ng&#225;ng lung l&#225;c gi&#225;i trách

## Thuốc Men: Nhúng Điếu Mà Họ Không Nói Ra

T&#225;c Gi&#7843;: D&#225;c sĩ Nguyễn Lan & Bác sĩ Thú y Nguyễn Chánh  
Th&#7913; S&#225;u, 25 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2009 08:39

---

những mặt trong chánh quy, và mê hoặc quần chúng về số tiền bỏ vào các ngành dâm dục phẩm.

Mục đích chính của các công ty dâm dục phẩm là \$\$\$tiền và chi tiêu\$\$\$ mà thôi!

Càng nhúng càng tốt để làm vỡ lòng các công nhân viên hèn là để phớt lờ quần chúng.

### Thuốc làm chết người khi ngủ

Bà Y tế Québec, Canada & các đồng nghiệp trong tiếng nói bình nhân nhúng vì thì phải có từ 10-15% người cao tuổi có vấn đề thuốc men mà họ đang sử dụng hàng ngày.

Các giới chức y tế Hoa Kỳ cho biết từ khi mới năm có vào khoảng 100.000 người chết vì thuốc men.

Năm 1998, Journal of The American Medical Association cho biết hàng năm có vào khoảng 106.000 người Hoa Kỳ chết vì lạm dụng thuốc men trong điều kiện bình thường.

Chứng hèn nhúng sai trái trong việc bác sĩ kê toa, chứ không phải có nguyên nhân do lạm dụng hay uống thuốc quá liều.

Trong vòng 25 năm qua, & 10% các loại thuốc mới tung ra thị trường phải bỏ thu hồi &.

Pháp & các đồng nghiệp mới năm sử dụng người phải nhúng vì thuốc là 130.000, trong số này có vào khoảng 8.000 - 13.000 người chết vì thuốc men, nghĩa là 2-3 & cao hèn sử dụng nhân chết tại nạn...xe cộ trên xa lộ!

Nhân chết vì thuốc, phần lớn là nhúng người trên 65 tuổi.

Sử dụng người già càng gia tăng, thì kéo theo sử gia tăng trong việc tiêu thụ thuốc.

Anh Quốc cũng vậy, có & 10.000 người chết hàng năm vì nhúng lý do thuốc men.

### Một hèn nhúng chết người

Chức mới người & u còn nhúng Micheal Jackson & qua. Anh ta chết vì phần & ng thuốc và vì có sử dụng lạm dụng thuốc!

Tại Pháp, có rất nhiều bệnh nhân cao niên & bác sĩ kê toa trên 10, thậm chí trên 15-20 món thuốc khác nhau.

Một thuốc thuốc cho bệnh thoái hóa khớp, một thuốc cho cao máu, một thuốc cho ng, một thuốc cho tiền liệt tuyến prostate, một thuốc khác cho cholesterol, v.v.

Rất & ng & y & ng hèn người & u ng các loại thuốc & ng lo âu (anxiolytiques), & ng & i cũng & ng luôn các thuốc & i tiểu (diurétiques) cho vấn đề hypertension.

Số phải hèn & a nhúng thuốc làm tăng nguy cơ giảm huyết áp, gọi là hypotension

orthostatique, có nghĩa là lúc bệnh nhân ng & i & y & ra khỏi giường thì huyết áp giảm tuột

xuống quá & t & t, khi & n hèn choáng váng té xuống sàn nhà và có thể & g & y & ng nhúng & i.

Theo Bác sĩ S. Boukris, thì số phải hèn của thuốc an thần và thuốc & i tiểu là nguyên nhân & a tình trạng té ngã nói trên!

Trẻ em và giới trẻ tuổi cũng là & n nhân & a thuốc

Nhúng người & i tuột, trẻ em & u trẻ & ng thuốc & ng trẻ & m cũng có thể là & n nhân & a các phần & ng &.

Một khảo cứu & Đ&#225;c th&#225;c hi&#225;n năm 2005, cho th&#225;y phần & ng phần & a thuốc là nguyên nhân & a 12% số trẻ em & m bệnh & i.

C&#225; quan & o hi&#225;m số & kh&#225;e Caisse d'Assurance Maladie de l'Aude bên Pháp, cho bi&#225;t ch&#225; trong năm 2001 có trên 1.000 toa AINS ( anti-inflammatoires non st&#225;roïdiens) không phù & p cho trẻ em.

Trong số trên, có 108 toa thuốc Niaprazine (Nopron) thuốc nhóm anti-histaminique, & m & k & trẻ em & i 3 tuổi, & i & & c số & ng cho nhúng trẻ em còn quá nhúng & i... 570 toa có Eucalyptol (calyptol inhalant), & m & k & trẻ em & i 12 tuổi vì có thể gây & i.

Năm 2003, Anh Quốc cho biết có & 30.000- 40.000 trẻ em & & c kê toa thuốc & trẻ & m & m

## Thuốc Men: Nhúng Đùi Mà Họ Không Nói Ra

T&#225;c Gi&#7843;: D&#225;c sĩ Nguyễn Ngọc Lan & Bác sĩ Thú y Nguyễn Thành Chánh  
Th&#7913; S&#225;u, 25 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2009 08:39

---

antidépresseurs, trong khi luật không cho phép các loại thuốc trên được sử dụng cho trẻ em mất hứng thú và nhút nhát nào đó!

### Thuốc an thần gây ảo giác (calmants hallucinogènes)

Năm 2007, các giới trách nhiệm Úc Châu cảnh giác các bác sĩ bên đó về những hiện tượng rối loạn thần kinh gây nên bởi thuốc Zolpidem (Stilnox) thuốc nhóm thuốc ngủ hypnotiques.

Các rối loạn ghi nhận là ảo giác hallucinations, mất trí nhớ amnésie những đáng ngờ nhất là gây ra tình trạng mộng du somnambulisme lạ thường.

Một bệnh nhân thân yếu lúc nửa khuya đang đứng ăn trái cây thì bỗng nhiên mất ngủ dù cô ta đang ngủ. Số kilôgam khi cô ta tăng 23 kg trong vòng 7 tháng.

Một người khác thức dậy khi đang cầm một cây cưa trong tay. Anh ta vừa sững sờ trong lúc ngủ của phòng của anh ta.

Có người khác thì lái xe đang lúc ngủ thì tắt đèn không phải là đang ngủ gật.

### Phản ứng phụ chết người

Đa số bệnh nhân mất nhóm thuốc nào cũng đều có thể gây ra phản ứng phụ chết người. Có thể chết người nếu dùng bừa bãi nhân yếu.

Các thuốc chống viêm steroid trừ đau nhức khớp có thể gây loét bao tử ulcères gastro duodénaux và gây xuất huyết...

Các thuốc chống đau nhức thông thường như paracétamol (Doliprane, Efferalgan, Dalfalgan) có thể gây viêm gan trầm trọng.

Riêng còn các loại thuốc trầm cảm tâm thần (psychotropes) là tác nhân của 10%-30% ca nhập viện khẩn cấp bên Pháp, nhất là các bệnh nhân cao tuổi.

Thuốc trị mụn như thiêu u niên có chứa chất Isotrétinoïne (Proacutane) có thể gây ra những phản ứng phụ quan trọng về tâm thần.

Tháng 3/2007, Cơ quan FDA đã cảnh báo các vấn đề do Proacutane gây ra.

Từ 1982-2000 đã có 37 ca quỵ sinh (24 ca trong thời gian đang điều trị và 13 ca sau khi trị), 110 ca nhập viện vì trầm cảm, có ý tưởng quỵ sinh hay đang tìm cách quỵ sinh, và 284 ca trầm cảm nhưng không cần phải nhập viện.

### Cai thuốc lá có hại

Năm 2001, thuốc Bupropion (Zyban) được tung ra thị trường.

Đây là chất amfébutamone mà ngày xưa được dùng như thuốc chống đói anorexigène, những người rút ra khỏi thị trường năm 1999 vì có phản ứng làm tăng huyết áp tim và phổi.

Kết luận

Thật vậy, tất cả thuốc men đều có thể có phản ứng phụ nào đó, những cũng nên ghi nhận rằng thuốc men cũng đã giúp hàng triệu người phục hồi sức khỏe và bình thường, và giúp con người kéo dài thêm tuổi thọ...

Phản hồi của một dược sĩ hành nghề tại Pháp: Dược sĩ mới là nhân thân tốt nhất: áp lực từ khách hàng bệnh nhân không hài lòng những họ mong muốn hoặc có khi còn bệnh mà không chữa, và áp lực từ người có quyền uy tại cao là BÁC SĨ KÊ TOA.