

Viagra và Đỉnh Nhóm

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-Đác M.D.

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 07:29

Theo thống kê, có tới 5% nam giới ở tuổi trên 40 và 25% các cặp trên 65 tuổi đang ở trong tình trạng "mất nhỉnh mùa xuân" này.



Trong hơn mười năm vừa qua, mất trong nhỉnh dác phẩm đác nhác nhá tái khá nhiáu và cũng đác nhiáu ngáời sử dụng là thuốc chữa Bệnh Rái Loán Cáng Dáng Viagra. Viagra đác đưa vào thị trường vào năm 1998 và đã mang lại niềm vui xuân tình cho khá đông nam giới chấp nháng may mắn vào tình trạng "trên báo đái không nghe" của sinh hoạt tình dác.

Váy thì rái loán cáng đáng là gì?

Đây là mất rái loán về tính cách lán và cáng của quan sinh dác ngáời nam.

Theo National Health Institute Hoa Kỳ, RLCD là sự tháng xuyên không có khả năng hoàn tất và/hoặc duy trì sự cáng cáng để có giao hợp tình dác tháa mãn.

Trước đây, rái loán này đác gọi là bệnh bất lực nam giới (male impotence) hoặc liệt dáng. Nháng vài thập niên vừa qua, các cặp có tính cách « tiêu cực » trên đác thay thế với danh từ Rái Loán Cáng Dáng, nghe có vẻ nhá nhàng và chính xác hơn, vì ngáời bệnh không mất chức năng sinh lý, vẫn duy trì đác việc có con. Họ vẫn còn có muán tình dác, vẫn muán phòng the. Nháng khán nái « cực cáng » lại quá ráu mám sáu, không xâm nháp sâu vào cái "hám hám" đác để hoàn tất tháa mãn đáng tác làm tình cho tới lúc xuất tinh. Cũng nhá không đáp áng đác sự đòi hỏi của đái táng.

Sác cáng cáng là nhá nhiáu máu tràn ngập vào mô xốp trong đáng cá sau khi có kích thích của sự muán tình dác. Sác cáng này cũng xảy ra cho âm vật (clitoris) khi ngáời nữ có kích thích sinh lý.

Rái loán này có thể là tạm thời vì căng thẳng tinh thần, lo âu, trầm cảm. Nháng trầm trọng hơn là bệnh nhân tiểu đáng, bệnh xơ cứng đáng mạch, cao huyết áp, cao cholesterol, suy thận, sau phẫu thuật hoặc hóa trị ung thư nhiếp tuyến, nghiện rượu. Bệnh cũng thay đổi ngáời ghi nhận thuốc lá, béo phì hoặc do tác động của trên 200 loại dược phẩm như thuốc lợi tiểu, hạ huyết áp, chống trầm cảm, chống đáng, trầm bệnh Parkinson, giãn cơ, hóa trị, các chất nicotine, thuốc phiện. Các thuốc này trấn áp hệ thần kinh trung ương và có thể gây tổn thương cho các đáng mạch và đưa tới RLCD.

Viagra và Đẳng Nhóm

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-Đác M.D.
Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 07:29

Trác đây, khi mà tình dác đác coi là riêng tá thì rái loán cáng đáng đáu có đác nhác nhá tái. Cho nên bánh nhân rái vào tình tráng cháu đáng, kém tá tin, mát mình mình cháu, mát mình mình hay, không dám than thá cùng ai.

Ngày nay, ván đá trá nên cái má hán, bác sĩ, bánh nhân dá dàng nghe và cháa. Các nghiên cáu cho hay RLCD có thá điáu trá đác cá bát cá tuái nào, vái nhiáu pháng tián khác nhau, trong đó có Viagra.

Theo tháng kê, có tái 5% nam giái á tuái trên 40 và 25% các cá trên 65 tuái đáng á trong tình tráng "mát nháng mùa xuân" này.

Trong hoàn cánh nào Viagra đác khám phá?

Khám phá ra tác dáng cáa Viagra là do mát sá tình cá. Nhá đã tình cá tìm ra kháng sinh Penicillin, thuác mác tóc Rogaine...Đó là khi các nhà khoa hác cáa vián bào chá Pfizer thá nghiám thuác sildenafil citrate đá cháa bánh nhân bá thiáu máu cá tim á mát sá ngáng i tình nguyán. Sau thái gian thá nghiám, quý tình nguyán viên tá chái hoàn trá sá thuác không dùng tái, vì "thuác giúp đáng cá chúng tôi cáng hán và kéo dài lâu hán tháng lá". Đó là mát trong máy tác dáng cáa thuác đáng thá nghiám.

Không bá lá cá hái, Pfizer bán đá tâm nghiên cáu thêm và tháy quá tình là hoát chát sildenafil có tác làm lán đáng cá. Há bán khai thác vì nháng ngáng i bá RLCD đáng mái cá trông chá tiên đác. Và công ty đát tên riêng cho sildenafil là Viagra, mát virility drug, viên thuác cáng đáng, nam tính.

Vào ngày 27 tháng 3 năm 1998, Viagra là đác phám đáu tiên đác cá quan Thác Đác Phám Hoa Ká cho phép sá đáng đá điáu trá RLCD. Tá đó tái nay thuác đã đác cá triáu triáu ngáng i chiáu cá, trong đó có Tháng nghá sĩ nguyên là áng cá viên Táng tháng Hoa Ká Bob Dole. Cá Tháng xuát hián trong mát cháng tráng truyán hình, ca ngái V là giúp rát nhiáu cho chuyán "liát đáng cáa cá" và đã giúp cá láy lái đác nhiáu mùa xuân sinh lý. Máy năm sau, các đác phám có tác dáng táng tá Cialis, Levitra cũng đác phép sá đáng.

Sá thành công vá mát tháng mái cáa Viagra quá lán khián cho nhiáu ngáng i nhá chá Viagra đá quáng cáo sán phám rám nhá (Max Vigna, VEagra).

Tác dáng cáa Viagra ra sao?

Nitric Oxid đác mô bào cá thá liên tác sán xuát á mác đá nhiáu ít khác nhau. Khi có kích thích hoác ham muán tình dác, chát Nitric Oxide đác sán xuát á mô sáp cá quan sinh dác nam. Qua mát chuái phán áng hóa hác, chát cyclic guanosine triphosphate (cGMP) thành hình. Chát này sá làm cho cá trán đáng mách đáng cá giãn, máu tràn ngáp vào, đáng cá to và cáng. Nháng cGMP không tán tái lâu. Náu cGMP sám bá háy hoái hoác có quá ít thì máu thoát ra khái đáng cá rát mau và cá quan này sá trá lái tình tráng á rá. Chính á giai đán này mà Viagra ra tay hành đáng: nó ngăn chán sá háy hoái cáa cGMP, khián cho mách máu tiáp tác giãn và cáng

Viagra và Dùng Nhóm

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-Đác M.D.

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 07:29

dùng kéo dài.

Vì vậy, Viagra chỉ có tác dụng khi người nam còn có các mußn hoßc khi còn khả năng đáp ứng với sự kích thích. Chỉ không phải là nhßm mèo chßm, chán chßng quay mặt đi, rồi nếu có mặt thuốc tiên V, nên chỉ "thßng kß".

Nhßc là ngày 21-11-2004, FDA đã nghiêm ngặt yêu cầu Pfizer rút lui khỏi thị trường Viagra giúp lý do là các mußn dßtính sexual drive vì không có căn bản khoa học.

Nhßng ai có thể dùng Viagra

Sildenafil được chỉ định cho bệnh nhân được chẩn đoán đang bị Rßi Loßn Cßng Dßng.

Thußc được trình bày dưới dạng viên màu xanh với viên 25, 50 và 100mg.

Lißu dùng tùy theo tuổi tác, tình trạng sức khỏe, các thuốc đang uống của bệnh nhân và sự do bác sĩ chỉ định. Trung bình là 50 mg/ ngày. Lißu dùng tối đa mỗi ngày là 100 mg. Không nên thay đổi liều dùng nếu chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Uống từ 30 phút đến 1 giờ trước khi giao hợp, bất cứ giờ nào trong ngày, khi đói cũng không sao.

Tác dụng kéo dài tới 4 giờ. Sau mỗi giao hợp, công dụng có thể tái diễn những tình dßch gißm dßn.

Rßt tiếc là hiện nay chưa có Viagra quý bà mặc dù theo bác sĩ Edward Laumann, Đại học Chicago, thì tỷ lệ rối loạn tình dßc tăng ở phụ nữ giới cao hơn nam giới.

Nhßng trường hợp không được dùng Viagra

-Đã dùng với hoạt chất sildenafil của Viagra.

-Trong khi đang uống thuốc của bệnh nhân đau thắt ngực có chất nitrates như Nitrate dán trên da, Nitroglycerin viên, amyl nitrate or nitroglycerin xịt. Sildenafil tăng tác dụng huyết áp của các thuốc này.

-Với người mà bác sĩ khuyên không nên có giao hợp như đang bị bệnh suy tim trầm trọng hoặc bệnh đau thắt ngực không ổn định.

-Số lượng dùng với sildenafil của bệnh nhân suy gan trầm trọng, huyết áp thấp, tim số tại bệnh nhân hoặc nếu máu của tim chưa được thông. Do đó những người này không được dùng Viagra.

Viagra có những tác dụng phụ gì

Viagra và Đing Nhóm

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-Đ c M.D.

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 07:29

Trong th i gian th nghi m, các khoa h c gia đã th y Viagra có các đ ng ngo i ý nh nóng ph ng trên m t (30.8%), nh c đ u (28%), ngh t mũi (18.7%), chua (10,5%), chóng m t. May m n là các tác đ ng này nh và ch tho ng qua.

Tuy nhiên m t tác đ ng ph khá quan tr ng là đã có tr ng h p vì dùng Viagra mà b mù, r i lo n th l c v i m u s c vì gi m máu l u hành t i dây th n kinh m t (optic nerve).

Đôi khi Viagra có th gây t vong ng i dùng đã b đ ng v i thu c.

N u đ ng v t c ng kéo dài trên 4 gi thì c n ph i đi c p c u ngay vì b ch ng c ng th ng xuyên (priapism), n u không, con chim s thi u máu, b h y ho i.

M t vài "bàn tán th phi" v Viagra . Nh là:

-Kh năng tác x lâu dài là do thu c tr l c ch không t b n thân, nên gi m ph n tình t , lãng m n, không có s "đột xu t" h ng tình do khôu gi i m i chào.

-Có th t o ra s "b t đ ng c m giác" nam n vì nam thì quá sung s c mà n thì ch ch u đ ng, ch ng tr . H u qu là nam nhân tìm đ i t ng t ng x ng khác. Do đó ch nên dùng khi có s "đ ng thu n" c a đôi bên.

-Hi n nay nhi u ng i tr không b RLCD cũng dùng Viagra nh m t đ c ph m gi i trí recreational drugs. Đây là đ i u ch ng nên làm vì nh ng tác đ ng ph c a thu c. Ng i b RLCD c n thu c thì đôi chút h u qu cũng b qua, nh ng còn hùng dũng mà cũng a dua dùng theo thì e r ng l i b t c p h i.

Khác bi t gi a Viagra và đing nhóm

Cho t i nay, có ba đ c ph m đ c công nh n đ ch a RLCD. Đó là Viagra, Cialis và Levitra v i cùng chung nguyên lý tác đ ng là làm cho máu vào đ ng c nhi u h n đ duy trì tình tr ng c ng lâu dài c a c quan này, n u ng i b nh còn duy trì đ c c mu n đ c tình.

Tên:	Cialis Tadalafil	Levitra Vardenafil hydrochloride	Viagra Sildenafil Citrate
-------------	---------------------	-------------------------------------	------------------------------

Ngày ra đ i:	Ngày 1/1/ 2003 1998	Ngày 20/8/ 2003	Ngày 27/ 3/
---------------------	------------------------	-----------------	-------------

Li u l ng:	5; 10 và 20 mg. mg.	2.5; 5; 10 và 20 mg.	25; 50 và 100
-------------------	------------------------	----------------------	---------------

Viagra và Đing Nhóm

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-Đác M.D.
Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 07:29

B&#223;t đ&#223;u v&#223;i:	10 mg. Ußng ½ giß -12 giß trßc	5 mg Ußng ½ giß trßc	50mg Ußng 1 giß khi giao hßp
T&#223;c đ&#223;ng:	17-36 giß	5 giß	4 giß
Giá ti&#223;n:	Nhß nhau	Nhß nhau	Nhß nhau
Thành công:	Tßng tß	Tßng tß	Tßng tß
T&#223;c đ&#223;ng ph&#223;i:	Nhß Viagra	Nhß Viagra	Coi phßi trên
Hình đ&#223;ng:	Hình hßt hßnh nhßn	Hình ngßn lßa	Xanh lßt
M&#223;u s&#223;c:	Mßu vàng	Màu cam	vßi chß
Pfizer &#223; gi&#223;a.			
Kh&#223;c bi&#223;t:	Tßc đßng kéo dài nhßt, ngßi	Công hißu bßt đßu rßt sßm, không bßnh hßng bßi thßc phßm tiêu thß	Ra đßi sßm đßc nhißu tin dßng

Kßt lußn

Trßc khi có Viagra và đßng nhóm thì rßi loßn cßng đßng đã đßc chßa trß vßi nhßng phßng tißn khác, nhß tâm lý trß lißu, chßch thußc trßc tißp vào đßng vßt, bßm tay hút máu vào đßng cß, gißi phßu, ghép chim plastic, nhßt viên Muse vào nißu đßo, ußng mßt chút testosterone, chßt yohimbine, đßc chßt trong nhißu loßi cây con thiên nhiên. Nhßng phßi công bßng mà nói rßng sß hißn đßn cßa "Ba Chßng Ngß Lâm Phßo Thß" C.L.V. có tác đßng tßt hßn và đß dßng hßn.

Tuy nhiên, mßt phßng khác cũng công hißu không kém mà lßi sßn có, không tßn nhißu tißn. Đó là tß tßo cho mình mßt nßp sßng lành mßnh vßi không rßu không thußc lá, vßn đßng cß thß đßu đßn, gißm thißu căng thßng lo âu trßm cßm. Và mßt tình yêu nam nß nßng cháy, thßt tình.

Phßng pháp mà nam nß ai ai cũng áp đßng đßc.

Viagra và Dùng Nhóm

Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn Ý-Đác M.D.

Chúa Nhật, 20 Tháng 6 Năm 2010 07:29
