

Hải hùng “công nghệ” trồng rau muống: Múi ngày cao... 10 cm

Tác Giả: PV Thanh Niên

Thứ Năm, 26 Tháng 8 Năm 2010 21:32

Nếu người dân sử dụng quá nhiều loại thuốc đổ vào rau thì không biết chuyển gì sẽ xảy ra cho con người.

Sau khi nắm bắt công nghệ trồng rau muống siêu tốc, sử dụng thuốc cấm, PV Thanh Niên phải hợp với khoa Nông học trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thực nghiệm những loại thuốc này, nhằm có những đánh giá khách quan.

Biết mục đích của PV Thanh Niên, Ban Giám hiệu nhà trường gửi i thi u PV xuống làm việc với khoa Nông học. Tại đây, thầy Võ Thái Dân (quy n Trưởng khoa) đã phân công một cán bộ đang là nghiên cứu sinh chủ trách nhiệm chọn nhóm sinh viên (SV) trồng rau muống trong nhà lưới của nhà trường, để thực nghiệm các loại thuốc mà PV thu thập được từ “công nghệ” trồng rau muống kinh hoàng...



Phun thuốc thực nghiệm

Hải hùng “công nghệ” trồng rau muống: Mãi ngày cao... 10 cm

Tác Giả: PV Thanh Niên

Thứ Năm, 26 Tháng 8 Năm 2010 21:32

Tuy nhiên, do trồng không có đất trồng rau muống nên vì c th nghiệm m đ c tiến hành trên rau muống c (gieo h t). Vì vậy, công đo n “đánh” nh t th i đ c b qua.



Rau th nghiệm m đ n ngày c t cao g n 60 cm

“Siêu siêu t c” và “siêu ngon”...

Nhóm SV mua h t rau muống, gieo trên 4 luống khác nhau, 2 luống trồng chăm bón bình thường, 2 luống còn lại th nghiệm riêng cho hai lo i thu c: viên “đ c” và thu c “mo”.

N u ng i dân s đ ng quá nhi u lo i thu c đổ vào rau, nh t là thu c “mo” thì không bi t chuy n gì s x y ra cho con ng i. (Th c sĩ Nguy n C u Tu)

Ngày 27.5, h t đ c gieo. Ngày 5.6, m m rau b t đ u nhú cao kho ng 5 cm và thu c b t đ u đ c “đánh” gi ng nh nh ng ng i tr ng rau làm. Đ i rau lên đ c 18 - 20 cm (có nghĩa tr c ngày thu ho ch 3 ngày) nhóm SV b t đ u th viên “đ c”. M t viên “đ c” đ c b làm 4, cho m t ph n vào thùng kho ng 20 lít n c cùng v i m t gói tr ng c ng đ “đánh” đi. Sáng hôm sau, nhóm SV t p t c “đánh” l i v i li u l ng nh l n “đánh” đi.

Ba ngày sau khi “đánh” l i, đo ki m tra thì có đ n 2/3 s cây rau s đ ng viên “đ c” cao h n rau tr ng bình th ng 16 đ n 18 cm (m i ngày cao t 5 đ n 6 cm); 1/3 s còn l i có đ n 80% cao thêm 25 cm, còn 20% thì đ t bi n cao thêm 30 cm (t c m i ngày cao 10 cm), đ c bi t c ng, lá r t đ p. Th nh ng, đ n ngày th 4 s rau tr ng th nghiệm này b t đ u cu n ng n (t c b von), cây g y. Sang ngày th 5 k t khi phun viên “đ c”, có cây tr ng chi u cao đ n 68 cm, tăng thêm g n 50 cm so v i tr c khi phun.

“Nhà sản xuất thuốc ProGibb T98 Gibberellic Acid là Mũ quy định hormone chất Gibberellic Acid (GA3) không vượt quá 0,15 mg/kg trong rau trồng, trái cây; Gibberellin (hormone GA4 + GA7 có trong viên “đỏ”) theo tiêu chuẩn là Mũ thì không quá 0,5 mg/kg đối với táo, nòng sản phẩm nông pháp phun. Còn ở VN người dân sản phẩm hormone chất này vô tội vạ, rất phổ biến. Nhưng theo Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15.10.2008 (quy định nồng độ hóa chất gây hại trong thực phẩm) của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT thì không có tên hormone chất GA3, GA4 + GA7 trong rau trồng, thực sĩ Lê Cao Long thực hiện.

Việc thử nghiệm thuốc “mỏ” cũng cho kết quả đúng như PV quan sát được ở người dân trồng rau sản phẩm. Thuốc được sản phẩm liên tục giết chết như những gì PV ghi được ở người dân và thời gian “đánh” đi, “đánh” lại cách nhau 1 ngày. Kết quả, sau 3 ngày “đánh” thuốc, phần rau thử nghiệm thuốc mọc tăng trưởng chiều cao thêm từ 14 đến 16 cm, thời gian rau sản phẩm viên “đỏ”, những người trồng rau dài hơn rất nhiều so với rau được phun viên “đỏ” và gấp 2-3 lần so với rau trồng bình thường. Đáng lưu ý, lá rau rất mềm và thân rau đỏ. Để đi tìm nòng mà người tiêu dùng dễ bị lừa là rau trông rất tươi và đỏ, nhìn thích mắt. “Với kết quả này, nòng sản phẩm có hai loại viên “đỏ” và thuốc “mỏ” thì đúng là cho rau muống “siêu siêu tươi” và người tiêu dùng dễ dàng bị lừa bởi rau trông “siêu ngon” thật”, với cán bộ phụ trách lúc đó như xét sau khi bắt thử nghiệm rau và cảm nhận rau vừa mềm vừa giòn...

Cũng theo với cán bộ phụ trách, mặc dù đang là nghiên cứu sinh của khoa Nông học thực hành “không hiểu loại thuốc này có hormone chất gì khiến cho rau tăng trưởng khác biệt với thuốc kích thích tăng trưởng đang được phép sản phẩm VN hiện nay”.

Hải hùng “công nghệ” trồng rau muống: Mỗi ngày cao... 10 cm

Tác Giả: PV Thanh Niên

Th#7913; N#259;m, 26 Th#225;ng 8 N#259;m 2010 21:32



Thầy giáo không nên dạy con cái của mình những bài học này



Cán b ph trách c t rau đ th nghi m - nh: Hoài Nam

Hải hùng “công nghệ” trồng rau muống: Mới ngày cao... 10 cm

Tác Giả: PV Thanh Niên

Thứ Năm, 26 Tháng 8 Năm 2010 21:32

PV tiếp xúc liên hệ với Trung tâm Kiểm soát tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung tâm 3), nhằm mục đích câu hỏi có hay không được tiếp trong thuốc “mô” và viên “đỏ”. Bà Trần Thị Mỹ Hiền, Phó giám đốc Trung tâm 3, sau khi tiếp nghe mục đích của PV và xem xét các loại thuốc PV đưa tới, cũng lên đầu bài “nếu không biết tên được tiếp thì không thể tìm được”. Theo bà Hiền, ngoài viên trong loại thuốc có đến hàng trăm hoạt chất, để tìm được được tiếp còn phải thuốc vào y học khách quan khác. Vì vậy, nếu có mang cả viên thuốc hoặc chai thuốc đó đi thì nghĩ mà để tìm tên hoạt chất cũng chưa chắc tìm được tiếp được...

Là một giảng viên bộ môn Bảo vệ môi trường nông nghiệp (khoa Nông học), thạc sĩ Lê Cao Lương “lúc tung” kho tìm hiểu của ông để tìm những thông tin liên quan đến hoạt chất có tên trên bao bì của viên “đỏ” Gibberellic Acid 1g. 96%. Từ thông tin của nhà sản xuất “Houston. IN. U.S.A.”, thạc sĩ Lương cho biết hoạt chất Gibberellic Acid được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phân cấp độ 3 (ít độc), nhưng vẫn rất nguy hiểm khi hoạt chất này tiếp đi vào người qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Còn với rau ăn lá, nhà sản xuất khuyến cáo không được vượt quá mức 0,15 mg/kg. “Nếu pha với nước để phun thì 1 công rau chưa được phép sử dụng không quá 2 viên”, thạc sĩ Lương nói.